

Избавиться от гельминтов, не навредив себе?

Каждый с детства знает, что от гельминтов нужно избавляться, но мало кто задумывается почему... Хотя уже давно ученые доказали, что паразиты внутри человека, могут вызвать большинство изменений и заболеваний каждого из нас.

А если учесть распространенность гельминтозов и практическую невозможность соблюдения всех профилактических мер – можно предположить, что и у Вас они тоже есть. А если вы контактируете с животными, любите клубнику и мясо – то есть повод задуматься от избавления от ненужного балласта.



Чаще всего гельминтозы проявляются в виде: запора, поноса, газов и вздутия, синдром раздраженного кишечника, боли в мышцах, аллергия, угри и проблемная кожа, анемия, проблемы с весом – как в меньшую, так и в большую сторону, нервозность и нарушение сна, синдром хронической усталости, ослабленный иммунитет и частые воспаления дыхательных путей и даже онкозаболевания.

Так что если вас беспокоит что-то из вышеперечисленного и вы не можете от этого избавиться, нужно думать о вездесущих паразитах.

Если вы решили расстаться с вашими гельминтами, то лечение должно быть комплексным – не только уничтожение самих паразитов, но и ликвидация последствий их жизнедеятельности в организме человека (энтоксикоз, алергизация и т. д), а также возможных проявлений токсикоза, аллергии в результате массовой гибели гельминтов на фоне применения антигельминтного средства.

Предотвратить отравление организма поможет современный высокоактивный сорбент 4 поколения – Атоксил, который действуя уже на 5 минуте – моментально связывая опасные для человека токсины при распаде гельминтов, что поможет расстаться с паразитами незаметно для самочувствия.

Согласно рекомендациям профессора С.А. Крамарева, главного детского инфекциониста Украины, лечение гельминтозов следует проводить в 3 этапа.

- 1-й этап: за 3-5 дней до назначения антигельминтного препарата проводится курс лечения антигистаминными средствами и энтеросорбентом (Атоксил).
- 2-й этап: Антигельминтный (Вормил, Вермокс) в 1-й день лечения принимается в половине разовой дозы, во 2-5-й день – в полной дозе. На фоне приема препарата продолжается лечение антигистаминными средствами и Атоксилем. При энтеробиозе в 1-й день дается полная доза препарата.
- 3-й этап: в течении 5 дней после завершения лечения антигельминтным продолжается прием антигистаминных средств и Атоксила.